



محاضرات الكيمياء التحويلية النظرية

pdfelement

أساسيات الكيمياء التحليلية

عمليات التحليل الكيميائي



أن يكون الطالب قادراً على تعريف التحليل الكيميائي وأقسامه، وكذلك وصف عمليات

التحليل الكيميائي.

الأهداف:

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. تعريف التحليل الكيميائي وتقسيمه إلى أنواعه.
٢. وصف كل خطوة من عمليات التحليل الكمي الكيميائي.

الوقت المتوقع:

٥ ساعات.

متطلبات الجدارة:

معرفة ما سبق دراسته في "جميع الحقائب السابقة".



عمليات التحليل الكيميائي

١. مقدمة :

تشمل هذه الوحدة مدخلاً للتحليل الكيميائي يستطيع الطالب من خلالها (١) تعريف التحليل الكيميائي و تفرعاته ، (٢) وصف عمليات التحليل الكمي الكيميائي و تطبيق خطواتها المتعددة في تحليل المادة كمياً و هي: تحديد المشكلة ، أخذ العينة ، تحضير العينة ، فصل المتدخلات ، القياسات والحسابات و محتوى التقارير.

٢. التحليل الكيميائي وأنواعه :

يمكن تقسيم التحليل الكيميائي إلى نوعين أساسيين هما التحليل النوعي و التحليل الكمي.

٢.١ التحليل النوعي Qualitative Analysis :

الغرض من التحليل النوعي Qualitative analysis هو الكشف عن أي مادة (عناصر كيميائية، أملاح بسيطة أو خليط من عدة مواد) في العينة محللة. و ينقسم هذا النوع من التحليل إلى فرعين رئيسيين:

١. التحليل النوعي للمركبات غير العضوية: في هذا النوع يُكشف عن وجود أو عدم وجود كاتيونات أو آنيونات لأملاح بسيطة أو خليط من الأملاح (مثلاً في سبيكة أو مركب كيميائي). و يعتمد هذا النوع من التحليل على التفاعل الكيميائي وكذلك على اختبارات اللهب.

٢. تحليل المركبات العضوية: هنا يتم الكشف عن الكربون و الهايدرات و الكبريت والنیتروجين ، ... الخ. كما يهدف إلى التعرف على الجزيئات أو المركبات العضوية الموجودة في العينة.

٢.٢ التحليل الكمي Quantitative Analysis :

يختص التحليل الكمي Quantitative analysis بتقدير نسبة المادة المراد تقاديرها في العينة ، و ينقسم إلى نوعين: التحليل الكمي الكيميائي Quantitative chemical analysis و التحليل الكمي الآلي Quantitative instrumental analysis .

يعتمد هذا النوع من التحليل على التفاعل الكيميائي التالي:

Remove Watermark Now



حيث Y هي المادة المعلومة التركيز و المسماة بالكافش Reagent ، X هي المادة المجهولة التركيز والمراد تقديرها ، و P النواتج.

- فإذا تم تقدير تركيز X مستخدما حجم الكافش (عند نقطة النهاية) و تركيزه و حجم المجهول فنسمي هذا النوع من التحاليل بالتحليل الحجمي Volumetric analysis.

- و إذا كانت دالة التحليل هي الوزن أي يتم تقدير نسبة X في الصيغة الموزونة للناتج P ، فإننا نكون في مجال التحليل الوزني Gravimetric.

و يلاحظ أن التحليل الكمي الكيميائي يعتمد على أدوات بسيطة مثل السحاحة و الميزان الحساس و بالتالي لا يعتمد على أجهزة معقدة. و تسمى طرق التحليل الكمي الكيميائي بالطرق التقليدية أو الكلاسيكية.



٢.٢.٢ التحليل الكمي الآلي : Quantitative Instrumental Analysis

يعتمد هذا النوع من التحليل على الصفات الطبيعية Physical Properties للمادة (مثل الامتصاص والابعاث) بحيث غالبا ما لا يستخدم أي تفاعل كيميائي. على سبيل المثال: تقدير الرصاص في الماء عن طريق الامتصاص الذري للطيف Atomic Absorption Spectrometry .

أحيانا تستعمل الطرق الطبيعية الكيميائية Physico-chemical Methods، مثل تقدير الكروم الموجود على شكل Cr^{3+} في كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 و ذلك بأكسدة هذا الأخير إلى أيون الكرومات CrO_4^{2-} .

و بعكس الطرق التقليدية، يعتمد التحليل الكمي الآلي على أجهزة أكثر تعقيدا بهدف تقدير الصفات الطبيعية للمادة المراد تقديرها بدقة و حساسية عالية ، و تظهر قدرة هذه الطرق في تقدير المواد ذات تراكيز صغيرة جدا.

٣. عمليات التحليل الكيميائي :

تحتوي عمليات التحليل الكمي على خطوات و عمليات متعددة يمكن ترتيبها كالتالي:

١. تحديد المشكلة.
٢. أخذ العينة.
٣. تحضير العينة.
٤. فصل المتداخلات.
٥. القياسات.
٦. الحسابات و التقارير.

٣ - ١ تحديد المشكلة : Defining the problem

عند تحديد المشكلة في التحليل الكمي يجب على المحلل الكيميائي أن يجيب على متطلبات كل خطوة من الخطوات التالية :

١. قبل تصميم عملية التحليل، يجب على المحلل معرفة نوع العينة و المعلومات المطلوبة منه.
٢. طريقة التحليل ستعتمد على المعلومات المطلوبة من المحلل :
 - أ. طريقة أخذ العينة.
 - ب. وزن العينة.
 - ج. دقة طريقة التحليل.
 - د. مصداقية طريقة التحليل.

٣. بعد التعرف على متطلبات التحليل، طريقة التحليل ستعتمد على عدة عوامل:

- أ. خبرة المحلل.
- ب. الأجهزة المتوفرة.
- ج. الدقة و المصداقية المطلوبة.
- د. الميزانية المتوفرة.
- هـ . مدة التحليل المتوفرة.

٣ - ٢ أخذ العينة : Sampling

العينة المطلوبة هي العينة المعبرة التي تمثل تمام التمثيل لنفس مكونات الكمية الكلية Bulk Homogeneous Material. ويكون الحصول على مثل هذه العينة سهلاً بالنسبة إلى المواد المت詹سة

كلما و النفط و الهواء و الدم و تزداد الصعوبة كلما قل التجانس Heterogeneous للكمية الكلية (صخور، تربة...).

و سنتطرق هنا إلى طرقأخذ عينات الماء و التربة.

١.٢.٣ أخذ عينات الماء : Water sampling

نوع العبوة المستخدمة لجمع عينات الماء يختلف حسب طبيعة المادة المراد تقديرها.

- لتقدير المكونات العضوية (مثل الدهون ، الزيوت ، المذيبات ، ...): تؤخذ العينة في عبوة من الزجاج المقوى (مثل البيريس Pyrex) تم وضعها في فرن حرق عند درجة 450 درجة مئوية قبل عملية أخذ العينة ب 24 ساعة.

- لتقدير المكونات غير العضوية تؤخذ العينة في عبوة من البوليمر مثل PTFE .polytetrafluoroethylene

ويجب ترشيح العينة أشلاء أو مباشرة بعد أخذها و ذلك لمنع امتصاص العناصر المذابة من قبل المواد المعلقة (أقل من 45 ميكرون) كما يجب حفظ العينة في حالة عدم تحليلها فورا كما يلي:

. تحفظ العينة عند درجة حرارة 4 درجة مئوية لمنع التبخر أو التحلل البيولوجي Biodegradation للمكونات المراد تحليلها.

- في حالة تحليل الكاتيونات ، يضاف حمض النيتريك النقى مباشرة بعد عملية الترشيح حتى يصبح الأُس الميدروجيني يساوى (pH = 2) و ذلك لمنع ترسب الكاتيونات على جدران العبوة.

٢.٢.٣ أخذ عينات التربة : Soil sampling

لجمع عينات من التربة تستخدم البريمة حتى عمق المحراث (30 سم تقريباً) وأقل عمق (10 سم) وللعديد من الأغراض يتم جمع عينة مكونه من (1 . 2 كجم) كأقل كمية مطلوبة بحيث تكون كافية لتوفير نصف كيلوجرام كعينة جافة. ويجب حفظ العينات في أكياس من البولي إثيلين Polyethylene قبل أخذها للمختبر للتجفيف والمعالجة.

٣. تحضير العينة : Sample preparation

١. التجفيف Drying و الوزن Weighing : يتم التجفيف في فرن تجفيف عند درجة 100 إلى 110 درجة مئوية لمدة 1- 2 ساعة و مباشرة بعد ذلك تترك العينة لكي تبرد في مجفف Desiccator. توزن العينة المجففة بدقة مستخدما ميزاناً حساساً.

في حالة تقدير مكونات غير عضوية في المواد العضوية (عينة عضوية) ، يتم التخلص من المكونات العضوية (غير المرغوب فيها) بطريقتين:

- التجفيف الجاف Dry ashing: هنا تحرق العينة عند درجة حرارة تتراوح بين 400 و 700 درجة مئوية لمدة 24 ساعة.

- التجفيف الرطب Wet ashing: هنا تحرق العينة بتسخينها في أحماض مؤكسدة مثل حمض النيترิก Nitric acid ، حمض الكبريتิก Sulfuric acid ، حمض البيروكلوريك ، أو خليط من الأحماض.

٣. إذابة العينة : Sample dissolution

- استخدام المذيب المناسب بشكل مباشر: من أهم المذيبات الماء الذي يذيبُ مركبات غير عضوية كثيرة إلى جانب عدد كبير من المركبات العضوية. فإن لم تذب العينة في الماء وكانت مركبة من مادة عضوية فنجرب المذيبات العضوية مثل الكحولات والكيتونات. وإذا كانت المواد المكونة للعينة غير عضوية فنستخدم الأحماض المعدنية بشكل انفرادي أو على شكل خليط مثل الماء الملكي Aqua Regia (HCl-HNO₃; 1:3).

- الصهر مع مركبات كيميائية ثم الإذابة في المذيب المناسب: وعند فشل جميع المحاولات الممكنة لإذابة العينة الغير عضوية، تصهر العينة مع المركب في فرن حرق عند درجات حرارة عالية. إذا كانت المواد الغير عضوية ذات طبيعة قاعدية يستخدم مثلاً بيروكبريتات البوتاسيوم K₂S₂O₅. أما إذا كانت المواد غير العضوية ذات طبيعة حامضية يستخدم مثلاً كربونات الصوديوم Na₂CO₃. وفي حالة كون المواد الغير عضوية صعبة الذوبان يستعمل مثلاً فوق أكسيد الصوديوم Na₂O₂. وأخيراً تذوب نواتج عملية الصهر بعد تبريدها في محلول مائي أو محلول حمضي مخفف.

٤. فصل المتداخلات : Eliminating interferences

يشمل المتداخل أي مادة غريبة يمكن أن تمنع التقدير الصحيح للمادة المراد تقديرها. المتداخلات تؤدي إلى خطأ في النتائج فيجب التخلص منها و يمكن تعريف عملية فصل المتداخلات بأنه فصل المكونات التي تتدخل مع المادة المراد تقديرها و تستخدم عدة طرق لفصلها: