



عند الحليب يكون الحليب خالي تماماً من حامض اللاكتيك ولكن عند تقدير الحموضة به مقدرة كحامض لاكتيك تكون حموضة الحليب بين (0.14 - 0.16 %) وترجع هذه الحموضة إلى وجود مركبات ذات تأثير حمضي في الحليب مثل :

- ١- ثاني أكسيد الكربون الذائب
- ٢- بروتينات الشرش
- ٣- أملاح السترات
- ٤- أملاح الفوسفات
- ٥- الكازين

هذا ما يسمى بالحموضة الطبيعية (Natural Acidity) للحليب وهي عبارة عن وجود مكونات ذات تأثير حمضي وهي كما سبق ما عدا حامض اللاكتيك . ولكن عند ترك الحليب فتره تقوم الميكروبات الموجودة طبيعياً في الحليب بتكسير ستر اللاكتوز وتكون حامض اللاكتيك وهذه تسمى بالحموضة المتولدة أو الحموضة الناشئة أو المتطرورة . ومن المعروف أن تركيز H في الحليب يبلغ 6.6 غ / لتر اي ان PH للحليب 6.6 تقريباً وهذا يعني ان الحليب حامضي التأثير وله القدرة على الارتباط بالقلويات المختلفة مثل NaOH فعند معادلة 10 مل من الحليب الطازج بعد خروجه من ضرع الحيوان بواسطة 9 / N من NaOH باستعمال دليل الفينونفتالين فان حوالي 1.9 مل من القاعدة تلزم لمعادلة الحموضة في الحليب وعند حساب الحموضة في الحليب مقدره كحامض لاكتيك في العينة فإنها تبلغ 0.16 % كما سبق ذكره ، والحموضة الطبيعية في الحليب مثل الاسيدروجيني تختلف من حيوان إلى آخر وهي مقدرة كحامض لاكتيك اما السرسوب فان حموضته مرتفعة بسبب احتواه على نسبة عالية من البروتينات .

ان عملية تقدير الحموضة للحليب من الاختبارات الضرورية عند استلامه في مصانع الالبان وإن الحموضة الناتجة من بعض التغيرات في الحليب والتي طرأت عليه بعد خروجه من الضرع مثل مهاجمة بكتيريا حامض اللاكتيك الموجودة في الحليب لسكر الحليب (اللاكتوز) مكونة حامض اللاكتيك تدعى هذه الحموضة بالحموضة المتطرورة (Developed Acidity) .

ومن الطرق الشائعة لتقدير الحموضة هي اضافة NaOH معلوم العيارية 0.1 ع الى حجم معين من الحليب الذي يحتوي على دليل الفينونفثالين حتى نقطه التعادل والتي تعني ان القاعدة تعادل حجم حامض اللاكتيك الموجود في الحليب وكما يلي :-



يعنى ان كل جزء واحد من القاعدة 0.1 ع يعادل 9 ملغم من حامض اللاكتيك ، حيث ان محلول واحد عباري من NaOH يحتوى اللتر الواحد منه على 40 غم من NaOH . وتقدر الحموضة حسب المعادلة التالية :-

$$\frac{\frac{100}{1000} \times 90 \times \text{عيارия NaOH}}{\text{وزن العينة} \times 1000} = \% \text{ الحموضة الكلية}$$

طريقة العمل :-

١. ضع باستخدام ماصة 10 مل من عينة الحليب في دورق زجاجي .
٢. اضف 3 - 5 قطرة من دليل الفينونفثالين الذي نسبته 0.01 .
٣. اضف محلول NaOH الموجود في الساحة قطرة باحتراز الى حين الحصول على لون وردي والذي يدل على معادلة القاعدة مع الحامض .
٤. احسب كمية القاعدة المستهلكة .
٥. اعد الخطوات للحصول على قراءة ثانية واحتساب معدل القراءتين .
٦. احسب مقدار الحموضة في النموذج مقدرة كحامض لاكتيك ، بتطبيق المعادلة السابقة .