

النصل الثالث

العناصر الغذائية (المغذيات)

Nutrients

Nutrients

العناصر الغذائية

عادة تناول الطعام مثل الحليب والسميد والبيض والخبز والفراكه والخضروات وغيرها من الأغذية المختلفة على وجبات وفترات مختلفة وعلى الرغم من كثرة هذه الأغذية إبراعها المختلفة التي تناولها فإن جميعها متحوّلة، حتى عند تحدّد من المكونات لا تتجاوز عدد أنواع الأغذية الموجودة في الطبيعة قد لا يكرر وجودها في أكثر من نوع واحد من هذه المكونات تدعى العناصر الغذائية أو المغذيات Nutrients وهذه العناصر وعدها التي تمثل أساساً وأكاليلات الحياة الأخرى تسمى وتنشى وتتكاثر تؤدي وظائفها بصورة حمائية بالذريعة التسممية لدى ضرورة من تحرير إرادة الحياة، ومقابل وجودها في الأغذية تبادل شأن شله الماء الماء العادي ويجزأ في أجساماً وأجسام الكائنات الحية الأخرى ب رغم أن هذا الوجود قد يختلف بالكائنات لكن بصورة غير كبيرة وهذه العناصر هي الكاربوهيدرات والدهون والبروتينات والفيتامينات والعناصر العذبة فضلاً عن الماء يمكن تصنيف هذه العناصر الغذائية Nutrients إلى الأقسام الآتية حسب الوظيفة الرئيسية التي تؤديها في الجسم برضم أن لكل منها عدة وظائف:

Supplier of Energy

١ - مجموعة الطاقة

Nutrients of growth and maintenance

٢ - مواد النمو والمحافظة على الجسم

Regulatory Nutrients

٣ - مجموعة المواد المنظمة

يمكن تعيين العناصر الغذائية نسبياً على أساس احتواها على الكربون العضوي
و بهذا يكون هناك ~~عناصر غذائية عضوية~~ Organic nutrients وتمثل ~~هذه المجموعة~~
~~الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والفيتامينات على حين تمثل المجموعة الثانية غير~~
~~العضوية الماء والعناصر الغذائية المعدنية~~ Inorganic nutrients وهي الماء والعناصر ~~الغذائية المعدنية~~.

إن عملية تقسيم العناصر الغذائية إلى عناصر طاقة ومواد النمو والتجدد ومجموعة منظمة ليست ثابتة بل تتغير حسب المجتمعات والدول. فالدول الصناعية والغنية مثلاً تعتمد على نسبة عالية من الطاقة تأتي من مصادر بروتينية حيوانية المصادر مقارنة بالدول الفقيرة والتي تعتمد بصورة رئيسية على الكربوهيدرات في تحرير الطاقة. وفي الدول الغنية نفسها نجد أنها تتفاوت بالاعتماد على مصادر الطاقة فبعض الدول نجد أنها تحصل على حوالي ١٠٪ من الطاقة من المواد البروتينية في حين نجد أن بعض المجتمعات مثل سكان الاسكا وأوروبا والاسكتلند يزداد حصولهم على الطاقة من المواد البروتينية حيث يحصلون على حوال نصف الطاقة الكلية من المواد البروتينية وشكل رئيس من مصادر حيوانية وهي عناصر بناء وتجدد.

الفصل الرابع

الكاربوهيدرات Carbohydrates

Carbohydrates

الكاربوهيدرات

الكاربوهيدرات عنصر مهم من العناصر الرئيسية Major Nutrients في التغذية البشرية في جميع أنحاء العالم لكونها تتميز بأنها الأكثر انتشاراً في الطبيعة والمتمثلة بالنشويات والسكريات فتصادرها البنية مهلة الزراعة والانتاج ، كما أنها تعتبر من ارخص مصادر الغذاء وأنها سهلة التخزين اذ يمكن حفظها لفترات طويلة وفي ظروف أقل عندها واهتمامًا موازنة بالاغذية الأخرى مثل الدهون والمواد البروتينية فضلاً عن ذلك فأنها من الناحية الغذائية تعد سهلة الهضم موازنة بغيرها من العناصر الغذائية الرئيسية . كل هذه الاسباب تجعل من الكاربوهيدرات ذات اهمية كبيرة كغذاء متوفراً للدول الفقيرة التي تتميز عادة بمتناخ وظروف جوية قاسية وسببية . يصعب فيها حفظ المواد الغذائية بصورة عامة .

تعريف الكاربوهيدرات

هناك ثلاثة عناصر رئيسية تكون الكاربوهيدرات هي الكاربون والاوكسجين والميدروجين CHO ويوجد الميدروجين والأوكسجين في تركيبها عادة بنسبة وجودهما في الماء أي 2 هيدروجين الى 1 اوكسجين اي H_2O عدا عدد من الشوائب مثل السكريات التي ينقصها الاوكسجين Deoxysugar حيث يكون نسبه وجود الاوكسجين أقل من واحد

وكذلك يوجد عدد من المركبات غير الكاربوهيدراتية التي تطبق عليها هذه النسبة مثل حامض الخليك والصيغة التركيبية الجزئية لهذه المركبات توجد بصورة $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$ مثل أساسها سبعة الكاربوهيدرات أي هيدرات الكاربون أو الكاربون الماء. ومن الناحية الكيميائية للجزئيات البنائية الصغيرة للكاربوهيدرات وهي السكريات البسيطة هي مركبات الدهايد *Aldohydes* او كيتون *Ketones* ثم هي عدداً من جماعي الميدروكسيل ركيزاً من المشعثات.

صنف الكاربوهيدرات

يمكن لتصنيف الكاربوهيدرات على جموعتين رئيسين ما:

Simple Sugars

آ- السكريات البسيطة

وتقسم الى جموعتين:

١- السكريات الاحادية

٢- السكريات الاوليكوميرية (عدد قليل من الوحدات البنائية)

Oligosaccharides

(١٠ - ٢ وحدات)

ب- السكريات المتعددة

وهي يندرجها تقسم على جموعتين ما:

١- السكريات المتعددة التجائسة

٢- السكريات المتعددة غير التجائسة

Monosaccharides

السكريات الاحادية

هي أبسط أنواع المواد الكاربوهيدراتية وهي أصغر الوحدات البنائية في السكريات وتكون عادة من هيكل كاريولي بين ٣ و ٧ ذرات كاربون ونسبة لذلك يمكن تسميتها بالترائيز *Triose* اذا كانت مكونة من ٣ ذرات كاربون وهكذا تسمى بالتروروز *Tetrose* والمتسوز *Pentose* والمتسوز *Hexose* والمتسوز *Heptose* اذا كانت مكونة من ٤ و ٥ و ٦ و ٧ ذرات كاربون هل التزالي. وتوجد سكريات الترائيز والتروروز والمتسوز على شكل مركبات وسيطة *Intermediate compounds* في عمليات الهضم والبناء او *Metabolism* ، أما السكريات البتريز والمتسوز فهي الاكثر شيوعاً في الطبيعة وهي موجودة في الخلايا

والأنسجة الحيوانية والنباتية بصورة سائدة ويكبات كبيرة وذات دور فسيولوجي مهم ومن هذه السكريات ماباً :

Pentoses

السكريات الخاسية

والصيغة التركيبية لها $C_5H_{10}O_5$
L اهم ما يمثل هذه المجموعة ثلاثة سكريات هي زايلوز Xylose - D والا راينوز -
Arabinose والراينوز ribose - D ونادراً ما توجد بشكل حر في الطبيعة لكن توجد في
النباتات خاصة سكريات متعددة على صورة بتوزان Pentosan .

D - Xylose

١ - الزايلوز

ويسمى سكر الخشب وهو أحد السكريات الخاسية المكونة لعقد ال Xylan والجزء الداعم في انسجة النباتات بصورة عامة وهو مكون للهيميسيلولز Hemicellulose وهو سكر غير قابل للتخرّر على حين تستطيع الحيوانات المجترة من الاستفادة منه بوساطة خلاه بالبكتيريا التي تعيش في الجهاز المفصلي لها .

L - Arabinose


٢ - الا راينوز

يوجد في المملكة النباتية ومنها الكرز Cherry على شكل عقد ال Araban وهو جزء من تركيب الهيميسيلولز Hemicellulose أيضاً موجود في البكتيريا والمواد البكتيرية بصورة عامة .


D - Ribose

٣ - الراينوز


وهو أحد السكريات الخاسية المهمة حيروياً الموجودة في الطبيعة ويدخل في تركيب الاحماض النووي مثل حامض الراينونكليك RNA وعند استبدال Ribonucleic acid او احلاط الفيبروجين محل مجموعة الميدروكسيل في هذه السكريات سكر ديوكسني راينوز Deoxyribose وهو يدخل في تركيب الاحماض النووي من نوع حامض ديوكسني راينونكليك DNA و هي التي تحمل الصفات الوراثية ويدخل الراينوز ايضاً في تركيب مركبات مهمة وب المختلفة مثل النيوكليوتايدات التي تكون الكثير من التركيب المهم مثل Adenosine Triphosphate ATP و مراتقات الازتمات المختلفة ال Conzymes .



L-Arabinose



D-Xylose



D-Ribose

Hexoses


السكريات السادسية

الصيغة التركيبية البنائية لهذه المجموعة هي $C_6H_{12}O_6$ وهي الأكثر أهمية بين السكريات ان معظم السكريات الـ Oligo saccharides وكذلك المتعددة مكونة منها وهي موجودة في الخلايا والأنسجة البنائية والحيوانية وهي شائعة في الطبيعة على شكل حز ومن هذه السكريات :-

Glucose

الكلوكرز


يطلق على هذا السكر سكر العنب grape sugar وسكر الدم واحتياطياً سكر الذرة . وهو سكر سادسي الديهايد Aaldose ويعد من اهم السكريات الأحادية فهو موجود بشكل حر ومرتبط بالسكريات الأخرى مثل الفركتوز والكالكتوز ، يوجد في الدم بشكل حر ويترافق مع تحلل السكريات الثنائية المتعددة المهدومة وكذلك من تحلل الكليكوجين المخزن في الكبد وبعد حلقة الوصل في تمثيل المواد الكاربوهيدراتية حيث تستخدمه الخلايا في تحريض الطاقة والمعاصر الغذائية الأخرى . موجود في الثمار الحلوة المذاق ولا سيما الفواكه مثل العنب والتمر والكرز والحمضيات وغيرها من الفواكه . ويوجد مرتبطة في سكر البنجر والقصب مع سكر الفركتوز كجزء من تركيب سكر السكروز وكذلك مرتبطة مع الكالكتوز في سكر الحليب اللاكتوز وهو جزء من السكريات الثلاثية والرباعية مثل الرافينوز Raffinose والستاكوز Stachyose وأيضاً جزء من السكريات المتعددة مثل النشا والسللوز والكليكوجين . ويمكن انتاجه تجاريًا أما بوساطة الحامض او الازيمات من مصادر النشا مثل البطاطا والذرة . بعد الكلوكرز من اهم السكريات المتخمرة fermentable sugars



D-Glucose

الفركتوز:


يسمى سكر الفواكه fruit sugar او الـlevulose Levulose وهو سكر عالي الذوبان ومن الصعوبة تبلوره وهو أكثر السكريات حللاً وهو سكر سداسي كيتوني Ketose يوجد بشكل حرف في الفواكه وكذلك في العسل والسكر المحول Invert sugar فإذا وجد في الطبيعة فإنه عادة يصاحب سكر الكلوکوز ولا سيما سكر السبکروز Sucrose وهو مكون لعدد من السكريات الثلاثية والرباعية مثل الرافينوز والستاکیوز ومكون للسكريات المتعددة الـ Fructan ومثال عليها هو الانولین Inulin وهو النشا الموجود في (نبات الخرشوف Dahlia tubers) وكذلك درنات الدالبا Jerusalem artichokes.



Galactose


الکالاکتوز

سكر سداسي الديهايد Aldose وهو أحد السكريات السداسية موجودة في الطبيعة بصورة مرتبطة عادة بالكلوکوز مثل سكر الحليب اللاكتوز Lactose ويندر وجوده بشكل حر مثل الكلوکوز والفركتوز. يوجد كذلك في سكر الرافينوز والستاکیوز وكذلك السكريات المتعددة في الصمغ العربي gum Arabic ويمكن تحويل الكالاکتوز إلى الكلوکوز في الكبد.



β -D-Galactose

هناك سكريات أقل اهمية من الناحية الحيوية مثل سكر المانوز D-mannose مكون للسكريات المتعددة mannan في تركيب النباتات وهو مكون للنوبي في كثير من الفواكه موجود كذلك في الخميرة ويدخل في تركيب الميوکويدات Mucooids وهي مواد كليكروبروتينات glycoproteins شبيه بالمواد المخاطية.



السكريات الالبكميرية (عدد قليل من الوحدات البنيوية) Oligosaccharides

وتشمل المركبات الكاربوهيدراتية او السكريات التي تتكون من وحدتين الى 10 وحدات من السكريات الأحادية تربط بعضها مع بعض بالآصرة الكليكوسيدية Glycosidic linkage او ما يسمى بالآصرة Ketal or acetal linkage وهذه الكاربوهيدرات تتحلل الى وحدات صغيرة من السكريات التي تكون منها ومن هذه المركبات :

آ- السكريات الثنائية : Disaccharides مكونة من وحدتين من السكريات الأحادية .

ب- السكريات الثلاثية : Trisaccharides مكونة من ثلاثة وحدات من السكريات الأحادية .


ج- السكريات الرابعة: Tetrasaccharides مكونة من أربع وحدات من السكريات الأحادية .

ومن السكريات الشائعة الموجودة في الطبيعة من هذه المجموع ما يأتي :

Sucrose

يعد من اهم السكريات الموجودة والشائعة في الطبيعة . يعرف بسكر المائدة Table sugar او السكر الاعتيادي وهو سكر ثانوي مكون من جزأين من الكلوکوز والفرکتوز ، (انظر تركيبه) : يوجد بشكل طبيعي في ثمار النباتات والمصدر الطبيعي له هو البنجر


السكري Sugar beet وكذلك قصب السكر Sugar cane وهو سكر غير مختزل لارتباط الجاميع المسؤولة عن ذلك وهي مجموعة الألديهايد في الكلوکوز مع مجموعة الكيتون الموجودة في الفركتوز. عند تحليله بوساطة الحامض أو الإنزيمات ينتج كميات متساوية من الكلوکوز والفرکتوز وهو ما يسمى بسكر المحلول Invert sugar وهو موجود بشكل طبيعي في العسل وتحلل هذا السكر في الأمعاء بوساطة إنزيم السكريز Sucrase إلى مكوناته من الكلوکوز والفرکتوز.



Maltose

المالتوز او سكر الشعير وهو من السكريات الثنائية مكون من وحدتين او جزأين من سكر الكلوکوز وهو من السكريات المختزلة. ويتجزأ عند تحليل النشا بوساطة إنزيم الامييليز - amylase الموجود مثلاً في الشعير المثبت malt وكذلك يوجد مثل هذا الإنزيم أيضاً في اللعاب Saliva وعصارة البنكرياس. سكر المالتوز هو جزء من النشا في السلائل المستقيمة له (الأمييلوز Amylose) ويرمز للأصارة الكليكوسيدية من جزيئة الكلوکوز - 1-4 اي بين ذرة الكاريون الأولى من جزيئة ذرة الكاريون الرابعة من جزيئة السكر الثاني. أما السكر الموجود عند التفرعات خاصة في جزء الامييلوبكتين Amylopectin من النشا فيسمى سكر الإيزومالتوز Isomaltose تكون الأصارة الموجودة بين جزيئي الكلوکوز هي 6 - 1 اي بين ذرة الكاريون الأولى من جزيئة الكلوکوز مع ذرة الكاريون السادس من جزيئة الكلوکوز الثانية. وهو أيضاً سكر مختزل.


اما عندما تكون الأصارة بين جزيئي الكلوکوز من نوع 4 - 1 فيتكون لدينا سكر ثالث آخر هو سكر السليباپوز Cellobiose وهو جزء من تركيب السلولوز Cellulose وهو لا يتحلل بوساطة العصارات الجهاز العضسي للانسان لافتقارها لإنزيم السليوليز Cellulase .



Lactose

اللاكتوز

هو أيضاً من السكريات الثنائية الثالثة في الطبيعة ويعرف بسكر الحليب لأنه يوجد في الحليب فقط. وتكون من جزئين من سكر الكلوکوز وسكر الكالاکتوز وهو أيضاً من السكريات المختزلة. ودرجة حلاوه قليلة مقارنة بباقي السكريات. يمكن تحويله بوساطة لاحياء المجهرية مثل بكتيريا حامض اللاكتيك Lactic acid bacteria إلى حامض اللاكتيك وذلك عند تخميس الحليب وتحويله إلى اللبن Yogurt.



Trisaccharides


السكريات الثلاثية

وهي السكريات التي تحتوي على ثلاثة وحدات أو جزيئات من السكريات الأحادية. ومن الأمثلة هذه المجموعة هي:

Raffinose

الرافينوز


يوجد في النباتات في البنجر السكري وكذلك بنور القطن وفول الصويا. وتحتوى من سكر الكلوکوز والفرکتوز والکالاکتوز (انظر التركيب).



Melezitose

المليزيتوز


وهو أحد السكريات الثلاثية المكون من وحدتي كلوكوز ووحدة فركتوز ويوجد في الملكة النباتية، ومنها الأشجار الصنوبرية وشجرة الليمون.



Gentianose

جنتيانوز


وهو أيضاً من السكريات الثلاثية المكون من وحدتي كلوكوز ووحدة فركتوز فهو شبيه بال مليزيتوز بكتوناته لكن تختلف فيه الروابط بين السكريات الأحادية اانظر التركيب. يوجد أيضاً في الملكة النباتية ولاسيما في جذور نبات الجنتيانا Gentian خاصة في جذورها.



Tetrasaccharides

السكريات الرباعية

خير مثال لهذه المجموعة الموجودة في الطبيعة هو سكر ستاكيوز Stachyose وهو مكون من وحدتين من سكر الكالاكتوز ووحدة من كل من الكلوکوز والفرکوز. يوجد في المملكة النباتية بصورة واسعة. وهو سكر غير منتظر.




O- α -D-galactopyranosyl-(1 \rightarrow 2)O- α -D-galactopyranosyl-(1 \rightarrow 6)

O- α -D-glucopyranosyl-(1 \rightarrow 2) β -D-fructofuranoside

Oligosaccharides of milk


السكريات المتعددة الموجودة في الحليب

حليب البانين وخاصة حليب الانسان يحتوي عدا اللاكتوز على عدد من السكريات المختلطة والتي تكون من عدد قليل من وحدات السكر. القليل من هذا السكر يمكن الحصول عليه بشكل نقى او امكانية الحصول على تركيبة بشكل واضح. السكريات التي تم تشخيصها هي: الثلاثية والرباعية والخامسة والسادسة اي Tri و hexasaccharides, tetra- charides, penta- acid N - acetylneuraminic acid N - acetyl - D - glucosamine acid. احد هذه السكريات المشخصة والمفصلة من حليب الانسان هو لاكتوتراوز Lacto - N - tetraose لاحظ التركيب:



Lacto - N - tetraose

وقد تم تشخيص سكر ثلاثي اخر يدعى استيل لاكتامينيك لاكتوز - N - acetyl lactose في لب حليب الابقار وحليب الانسان لاحظ التركيب .



N - acetyl-neuraminosyl-lactose.

ان حامض استيل تيوراميثك (Sialic acid) المرتبط مع اللاكتوز يوجد بصورة واسعة في الطبيعة وعادة ما يكون مرتبط او حرض من تركيب الكليكي بروتين glycoproteins سواء في الدم او المخاط وغيرها . وهو مكون لبعض تراكيب السكريات الدهنية glycolipids ومنها المركبات المهمة الكنكليوسايدes gangliosides وهي مكونات مهمة تدخل في تركيب خلايا الجهاز العصبي موجودة في خلايا الطحال وكريات الدم . وبصورة عامة فان السكريات المتعددة القصيرة السلسلة هذه تظهر بنشاط وبعض خصائص جاميع الدم وكذلك مستقبلات receptors لعدد من الخلايا ضمن تركيب الغشاء الخلوي .

السكريات المتعددة

Polysaccharides

تعرف الكاربوهيدرات التي تحتوي على أكثر من 10 وحدات من السكريات الأحادية بالسكريات المتعددة Polysaccharides. وعادة توجد معظم الكاربوهيدرات في الطبيعة على شكل السكريات المتعددة ذات أوزان جزيئية عالية تختلف في طبيعتها البلورية Polymeric ومنها بشكل سلاسل مستقيمة ومنها بشكل متفرعات معقدة. وكما ذكرنا هناك نوعان من السكريات المتعددة هي:

السكريات المتعددة التجانسة Homopolysaccharides التي تتبع نوعاً واحداً من السكريات الأحادية عند تحليلها. أما النوع الثاني فهو السكريات المتعددة غير التجانسة Heteropolysaccharides الذي يتبع أكثر من نوع واحد من السكريات الأحادية عند تحليلها. ومن هذه السكريات التجانسة ما يأتي:

Starch

النشا

يعد من أهم مركبات الكاربوهيدرات الموجودة في الطبيعة وهو موجود على شكل مخزون في النباتات حيث يكون حوالي أكثر من ٥٠٪ من مجموع الكاربوهيدرات التي يتناولها الإنسان ويوجد بشكل حبيبات نشوءة تختلف بشكلها وحجمها حسب نوع ومصدر النشا. يتكون النشا من مكونين أساسين هما الأмиلوز Amylose والأميlopeكتين Amylopectin. تراوح نسبة الأмиلوز ١٠-٣٠٪ على حين يؤلف الأميlopeكتين النسبة الباقية (٧٠-٩٠٪). يكون كلا المكونين من وحدات بنائية من الكلوکوز لكن يختلفان في التركيب. حيث يتكون الأмиلوز من سلاسل مستقيمة من وحدات الكلوکوز المرتبط بعضها مع بعض بأواصر كليوكوسيدية من نوع الفا ١-٤. وتتراوح عدد وحدات الكلوکوز بين ١٠٠-٢٠٠ وحدة بنائية. أما الأميlopeكتين فإنه يتكون من سلاسل متفرعة من وحدات الكلوکوز مرتبطة ببعضها مع بعض بأواصر من نوع ألفا ١-٦ بحيث يتكون المسقببة منه ثم ارتباط هذه السلاسل بأصوات أخرى من نوع الفا ١-٤ لتكون السلاسل المتفرعة مابين ٢٤-٣٠ وحدة كلوکوز، ويتذكر التفرع أيضاً لكل حوالي ٢٤ وحدة كلوکوز على السلسلة الرئيسية للأميlopeكتين يكون الوزن الجزيئي للأميلوز قليلاً قد لا يتجاوز الـ ٤٠٠,٠٠٠ على حين يكون الوزن الجزيئي للأميlopeكتين على أقل تقدير المليون. انظر الشكل وتركيب النشا.